

第②類医薬品

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要ときに読めるよう、大切に保管してください。

生薬（地竜エキス）配合
総合感冒薬

一風散^{カプセル}

「かぜは万病のもと」早くなおしましょう。この白いカプセル剤の特徴は生薬の
みみず（地竜）エキスを配合しているところにあります。みみずはその学名を地
竜と云い、太古の昔から民間漢方薬としてかぜやねつさましに用いられてきた貴
重な生薬です。かぜがなかなかおらない、熱もとれない、そのような場合に、
みみずを煎じてのめばふしぎに良く効くことは古くから知られています。このよ
うに独特の薬効を有するみみず（地竜）の有効成分を科学的、衛生的にエキスと
して抽出し、これにみみず（地竜）エキス以外の数種の化学薬品を加え、合理的
に配合して総合感冒薬のカプセル剤としたのが一風散カプセルです。東洋薬学と
西洋薬学の相乗作用によりかぜの諸症状に優れた効果をします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する
内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります）
- 服用前後は飲酒しないでください
- 長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザに かかっている又はその疑い
のある乳・幼・小児（15才未満）。
(5) 高齢者。
(6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、
腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼 吸 器	息切れ、息苦しさ
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	過度の体温低下

裏面もお読みください

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、 のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 （スティーブンス・ジョンソン症候群）、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の 広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦 しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、 持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみ える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくとする、血 尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強
が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。 口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能又は効果〕

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、
発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

〔用法・用量〕 次の量を食後約30分以内に、水又はお湯と一緒に服用すること。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15才以上）	2 カプセル	3 回
7才以上15才未満	1 カプセル	3 回

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。(2) 7～14歳に服用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに服用させてください。(3) カプセルの取り出し方:カプセルの入っている
PTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤
ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等の思わぬ事故につながります。)

〔成分・分量〕 6カプセル（成人の1日服用量）中に次の成分を含んでいます。

は た ら き	成 分	含 量
熱を下げる・抗炎症作用	地竜エキス （地竜原生薬として）	9 0 mg （ 6 0 0 mg）
いたみをやわらげる・熱を下げる	エテンザミド	1 2 0 0 mg
気管支を拡張し、咳や痰を鎮める	dl-メチルエフェドリン塩酸塩	6 0 mg
せきやたんを鎮める	ノスカピン	4 8 mg
せきやたんを鎮める	臭化水素酸デキストロメトルファン	4 8 mg
くしゃみ、鼻水、鼻づまりに効く	クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5 mg
頭重やへん頭痛に効く	無水カフェイン	7 5 mg

添加物：バレイショデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム
保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届か
ない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり
品質が変わることがあります。)

■お問い合わせ先

天真堂製薬株式会社 お客様相談
奈良県高市郡明日香村越 4 9 5 の 1
電話 0 7 4 4 (5 4) 3 0 8 8 (代表)
受付時間:午前 9 時から午後 5 時まで（土、祝日を除く）

製造販売元

天 真 堂 製 薬 株 式 会 社
奈良県高市郡明日香村越 4 9 5 の 1
副作用被害救済制度 ☎0120-149-931