

使用に際しては、この箱をよくお読みください。

ドローチ[®]S

指定医薬部外品

効能・効果

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

用法・用量

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児 1回2粒、1日3～6回、1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用してください。2時間以上の間隔をおいて使用してください。5歳未満は使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

成分・分量(12粒中)

セチルピリジニウム塩化物水和物(口内殺菌成分)……………6mg
グリチルリチン酸二カリウム(消炎成分)……………15mg
キキョウ流エキス(鎮咳去痰生薬)……………1,200mg
添加物:白糖、水アメ、銅クロロフィリンNa、トメントール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、フェニルエチルアルコール、プロピレングリコール

⚠️使用上の注意

■相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 開封後は吸湿を避けるため、袋の口を折り返して保管してください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品に関するお問い合わせ先
富山めぐみ製薬株式会社
お客様相談窓口
電話:076-421-5531
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

製造番号

使用期限



®は登録商標です。

ドローチ[®]S

指定医薬部外品

32粒(4粒×8スティック)

指定医薬部外品


↓
ここから
開けてください

4粒入り包装のスティックタイプ



ドローチ[®]S

のどのあれ、
殺菌、口臭



のど飴
(生薬配合)

指定医薬部外品

ドローチ[®]S

のどのあれ、殺菌、口臭
のど飴

発売元



富山めぐみ製薬株式会社
富山県富山市三番町3-10

製造販売元

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口110