

第2類医薬品

眼科用薬

使用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

アイエース プレミアム Premium

販売名：アイエースVプレミアム

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみ改善されない場合。
- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

用法・用量

1回1～3滴、1日3～6回点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。[汚染や異物混入（目やにやホコリなど）の原因となる]また、混濁したものは使用しないでください。
- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (6) 点眼用にのみ使用してください。

成分・分量

成分	分量	はたらき
シアノコバラミン(ビタミンB12)	0.01%	毛様体の働きを活発にし、目の疲れを改善します。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能の低下を改善し、目の疲れを和らげます。
ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.05%	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲労回復に有効です。
パンテノール	0.1%	活発な新陳代謝に必要な栄養成分として働き、目を守ります。
L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム(等量混合物)	1.0%	アミノ酸の一種で、目の細胞呼吸の活性化とともに栄養を与え、目の疲れを癒します。
タウリン	0.4%	目に栄養を与え、炎症によって傷ついた目の組織修復を助けます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.25%	角膜を保護し、目に潤いを与え、栄養補給を促進します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.05%	末梢血管収縮作用により、結膜（白目の部分）の充血を取り除きます。
イプシロン-アミノカプロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑制することにより、炎症の症状を鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.25%	炎症による目のかゆみ、まぶたのただれなどの症状を鎮めます。
ベルベリン硫酸塩水和物	0.01%	

添加物：エデト酸ナトリウム水和物、L-メントール、塩化ナトリウム、クロロブタノール、D-ボルネオール、プロピルパラベン、ホウ酸、メチルパラベン

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用してください。
- (6) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼなどで軽くふきとって使用してください。
- (7) 液色は成分の色です。液剤が衣服などに付くと着色することがありますので、付かないように十分注意してください。
- (8) 容器に他のものを入れて使用しないでください。

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
0120-149-931

発売元
常盤薬品工業株式会社
神戸市中央区港島中町6-13-1
NOEVIR GROUP

製造販売元
佐賀製薬株式会社
佐賀県三養基郡基山町小倉481

179130
SGSE401